

FROM : DIRECTIA-FITOSANITARA BZ  
UNITATEA FITOSANITARĂ  
BUZĂU

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA  
SI PISCICULTURA, BUZAU  
FAX NO : 0238 210073  
INTRARE NR. 2632  
ZI 21 LUNA 05 AN 2014  
May. 22 2014 01:01AM P1



**AVERTIZAREA NR. 41 / 21.05.2014**

**Botrytis cinerea** ( putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**( putregaiul alb), **Phoma blattari** ( frangerea tulpinilor ), **Plasmopara helianti** ( mana florii soarelui ). – **FLOAREA SOARELUI**

**Topsin 70 WDG** = 1,0 kg/ha sau **Acanto Plus** = 0,6 L/ha ( 2 tratamente ) sau **Topsin 500 SC** = 1,4 L/ha ( 2 tratamente in vegetatic ) ;

Tratamentul se va aplica in faza fenologica de 6-8 perechi de frunze.

**La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti)** se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 42 / 21 .05.2014**

**Eurygaster spp.** ( plosnita cerealelor ) , **Anisoplia spp** ( carabuscii cerealelor), **Lema melanopa** (gandacul balos) , **Complex boli boli foliare si ale spicului** – **CEREALE PAIOASE**

**Insecticide** : **Faster 10 CE** = 100 ml/ha sau **Alfametrin 10 EC** =100 ml % ha sau **Biscaya 240 OD** = 0,2 l/ha sau **Fury 10 EC** = 0,1 L./ha . + **Fungicid** : **Topsin AL 70 PU** = 1 KG / HA **Trineo 25 EW** = 0,5 l / ha , **Evolus** = 1,0 l / ha , **Mystic Extra** = 0,750 l/ha etc .

Tratamentul se va aplica atunci cand majoritatea larvelor de plosnita sunt de varsta a III a si la densitati de 3 exemplare / mp pentru culturile destinate producerii graului de sãmanță si de 5 exemplare/ mp pentru culturile destinate graului de consum ; pentru carabuseii cerealelor la un PED = 5 exemplare / mp , iar pentru gandacul balos la un PED = 250 larve / mp .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 43 / 21 .05.2014**

Boli foliare si daunatori – **CASTRAVETI , PEPENI**

1. **Curzate Manox** = 2,5 kg/ha (0,25%) + **Systhane Forte** = 0,02% ( 0,2L/ha ) + **Mospilan 20 SP** = 0,0125%

2. **Antracol 70 WP** = 0,2% + **Trineo 25 EW** = 0,5 L/ha + **Faster 10 CE** = 0,03%

Tratamentul se va excruta la depistare , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mcdiului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din România privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide ( produse de protectia plantelor ),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Ing. Borjoiu Liviu