


DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDETEANĂ BUZĂU
UNITATEA FITOSANITARĂ BUZĂU



AVERTIZAREA NR 82 / 11.11.2014

Paduchele din San - Jose , paduchele lănos ,oua de aphidae , psylidae , acarieni , etc. –
POMI FRUCTIFERI

Confidor Oil SC 004 = 1,5 % (la mar – 22,5 litri / ha in 1500 l apa ; la prun 15 litri / ha in 1000 litri apa) sau **Nuprid Oil 004 CE = 1,5 %** mar (22,5 L / ha in 1500 litri apa) ; prun , cires, cais si piersic = 1,5 % (15 litri / ha in 1000 litri apa) .

Tratamentul se va executa dupa caderea a cel putin 90 % din frunze. Al doilea tratament se va repeta cel mai devreme dupa 30 de zile de la primul si se poate prelungi pana cand 1-5 % din mugurii florali sunt la faza de umflare. Ambele tratamente se executa numai in zilele in care temperatura atmosferica este mai mare de +4 °C ; +5 °C .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Ing. Borjoiu Liviu