


DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA BUZAU
UNITATEA FITOSANITARA BUZAU



AVERTIZAREA NR. 1 / 15.01.2015

Paduchele din San – Jose , paduchele lanos ,oua de aphidae , psylidae , acarieni,
 etc. – Pomi Fructiferi

Mospilan 20 SG = 0,450 kg / ha + 0,5 % **Toil** (adjuvant pe baza de ulci vegetal) – mar , prun
 sau **Confidor Oil SC 004** = 1,5 % (22,5 L / ha) – mar ; 1,5 % 15 L / ha in 1000 litri apa) – prun sau
Nuprid Oil 004 CE = 1,5 % (22,5 L / ha in 1500 litri apa) – mar ; 1,5 % (15 L / ha in 1000 litri apa) –
 prun ,cais , cires

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala ,la temperaturi de + 4 °C ;
 + 5 ° C , la pomii fara apa , chiciura sau polei .

Pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va efectua pana la faza de infrunzitul mugurilor – faza
 de urechiusa ,iar pentru speciile pomicole samburoase tratamentul se va efectua pana la sfarsitul
 repausului vegetativ – faza de buton verde .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum
 si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41
 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 2 / 15.01.2015

Erwinia amylovora (Focul bacterian al rozaceelor) – MAR, PAR, GUTUI

Taierea mecanica a ramurilor cu simptome la o distanta de cel putin 50 cm sub limita prezentei
 simptomelor. Intregul material vegetal se va strange si se va distruge prin ardere. Instrumentele folosite la
 taiere vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare cu **hipoclorit de sodiu** 10 % , concentratie de 1 % .
 Ulceratiile de pe trunchi vor fi extirpate inclusiv tesutul marginal de 2 cm, iar rana se dezinfecteaza.
 Ranile rezultate la taiere, vor fi dezinfectate cu **1 % oxiclorigura de cupru**. Lucrarea se va executa inainte
 de taierile obisnuite din livada si pana la intrarea in vegetatie a pomilor.

AVERTIZAREA NR. 3 / 15 .01.2015

TRATAMENT LA SOL – SPATII PROTEJATE

Basamid Granule (2) = 500,0 kg / ha - tomate sera (se administreaza la sol cu incorporare , inainte de
 plantare pentru combaterea agentilor fitopatogeni de sol : Phytophthora parasitica ; Fusarium spp. ;
 Verticillium dahliae , nematozi : Meloidogyne incognita) sau **Raisan 51** = 700 litri / ha - dezinfectia
 solului in sere si solarii (combatere agenti patogeni : Phytophthora parasitica ; Fusarium oxysporum ;
 Verticillium dahliae , nematozi -Meloidogyne incognita si buruieni)

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum
 si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 /
 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
 Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului
 Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei
 Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva
 intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in
 perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse
 de protectia plantelor.

Intocmit,
 Ing. Borjoiu Liviu