

INTRARE NR. 4805  
ZI 21 LUNA 05 AN 2015

AVERTIZAREA NR. 39 / 21.05.2015



**Botrytis cinerea** (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum** (putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frangerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florii soarelui). – FLOAREA SOARELUI

**Topsin 70 WDG** = 1,0 kg/ha sau **Acanto Plus** = 0,6 L/ha (2 tratamente) sau **Topsin 500 SC** = 1,4 L/ha (2 tratamente în vegetație);

Tratamentul se va aplica în faza fenologică de 6-8 perechi de frunze.

La depistarea manei florii soarelui (**plasmopara helianthi**) se recomandă eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora în saci de plastic sau hârtie și distrugerea lor prin ardere

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 40 / 21.05.2015

**Eurygaster spp.** (plosnita cerealelor), **Anisoplia spp.** (carabuseii cerealelor), **Lema melanopa** (gandacul balos), **Complex boli boli foliare și ale spicului** – CEREALE PAIOASE

**Insecticide**: **Faster 10 CE** = 100 ml/ha sau **Alfametrin 10 EC** = 100 ml % ha sau **Biscaya 240 OD** = 0,2 l/ha sau **Fury 10 EC** = 0,1 L/ha. + **Fungicid**: **Topsin AL 70 PU** = 1 KG / HA, **Trineo 25 EW** = 0,5 L / ha, **Evolus** = 1,0 L / ha, **Mystic Extra** = 0,750 L / ha etc.

Tratamentul se va aplica atunci când majoritatea larvelor de plosnita sunt de vârstă a III a și la densități de 3 exemplare / mp pentru culturile destinate producerii graului de sămânță și de 5 exemplare / mp pentru culturile destinate graului de consum; pentru carabuseii cerealelor la un PED = 5 exemplare / mp, iar pentru gandacul balos la un PED = 250 larve / mp.

Tratamentul se va aplica în condiții meteorologice optime, fără ploaie, la temperaturi sub 25 °C și la viteza vântului sub 5m/ secunda.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 41 / 21.05.2015

Boli foliare și daunatori – **CASTRAVETI, PEPENI**

1. **Curzate Manox** = 2,5 kg/ha (0,25%) + **Systhane Forte** = 0,02% (0,2L/ha) + **Mospilan 20 SP** = 0,0125%

2. **Antracol 70 WP** = 0,2% + **Trineo 25 EW** = 0,5 L/ha + **Faster 10 CE** = 0,03%

Tratamentul se va executa la depistare, se va termina în 5-6 zile și se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide (produse de protecția plantelor), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de "înflorire", pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Ing. Borjoiu Liviu