



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

REGISTRUL PENTRU AGRICULTURA  
JUDEȚEANĂ, BUZĂU  
INTRARE NR. 2234  
ZI 12 LUNA 03 AN 2016

**AVERTIZAREA NR. 7 / 04.03.2016**

**ANTHONOMUS POMORUM** ( Gargarita florilor de mar ), partial acarieni + **PODOSPHAERA LEUCOTRICHA** ( Fainarea marului ) - **MĂR**

1. Calypso 480 SC = 0,02 % (0,3 l/ha) + Karathane M 35 CE = 0,06% (0,9 l/ha).

Tratamentul se va aplica la momentul cand 10-15% din mugurii florali sunt la inceputul dez muguritului , la un PED de 2 adulti / pom si se va prelungi cu cate zile au fost nefavorabile stropirii.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

**AVERTIZAREA NR. 8 / 04.03.2016**

**TAPHRINA DEFORMANS** (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza), **SPHAEROTHECA P. var. persicae** (Fainare), **ASCOSPORA B.** ( Ciuruire ) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului ) + **GRAPHIOLITA MOLESTA** (Molia orientala ) etc. - **PIERSIC + CAIS**

Topsin 70 WDG = 0,07 % ( 0,7 kg / ha ) + Fastac 10 EC = 0,02%;

Insegar 25 WP = 0,03 % + Novozir MN = 0,2 % ( 2 Kg / ha )

Tratamentul se va aplica pe toata perioada fenofazei de buton roz cu repetare la 8 - 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

**AVERTIZAREA NR. 9 / 04.03.2016**

**DĂUNĂTORI LUCERNĂ** : ANUL II, III, IV DE VEGETAȚIE

Karate Zeon = 0,15 L / ha sau Fastac 10 EC = 0,15 L / ha sau Decis 2.5 EC = 0,3 L / ha .

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

**AVERTIZAREA NR. 10 / 04.03.2016**

**BOLI RAPITĂ** ( Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.) - **DAUNĂTORI RAPITĂ** - Complex daunatori - **RAPITĂ**

**Fungicide** - Caramba 60 SL = 1,0 L/ha sau Tilmor 240 EC = 1,0 L / ha sau Matiz = 1,0 L / ha sau Trineo 25 EW = 1,0 L / ha ;

**Insecticide** - Kaiso Sorbic 5 WG = 0,150 kg / ha sau Decis Mega 50 EW = 0,150 L / ha sau Karate Zeon = 0,150 L / ha sau Mavrik 2 F = 0,2 L / ha sau Nurelle D 50 / 500 EC = 0,4 L / ha sau Mospilan 20 SG = 0,2 Kg / ha

Tratamentul se va executa la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide ( produse de protectia plantelor ), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Întocmit,  
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
 OFICIUL FITOSANTAR BUZĂU



**AVERTIZAREA NR. 11 / 18.03.2016**

**ERWINIA AMYLOVORA** ( Focul bacterian al rozaceelor ) – **plantatii , pepiniere** : mar,par,gutui

**Triumf 40 WG** = mar 0,25 % ( 3,750 kg / ha /1500 litri apa)  
 = par 2,5 kg / ha (1000 litri apa pentru par)

**Alcupral 50 PU** = mar 0,2 % prefloral,  
 0,004 % post floralpar;  
 = par 0,3 % ( 3,0 kg / ha in 1000 litri apa )  
 = gutui 0,3 % ( 4,5 kg / ha) prefloral  
 0,04 % ( 0,6 kg / ha)postfloral

**Champion 50 WP pentru mar** = 0,2 % pentru mar prefloral si 0,04 % post floral , pentru par si gutui  
 = 0,3 % prefloral si 0,04 % post floral .

**Tratamentul se va aplica prefloral pana la rasfirarea inflorescentei.**

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

**AVERTIZAREA NR. 12 / 18.03.2016**

**MONILINIA spp.** (Monilioza); **CORYNEUM BELJERINKII** (Ciuruire) etc. + **INSECTE DEFOLIATOARE , APHIDAE** etc. – **CIREȘ+ VISIN**

**Topsin 70 WDC** = 0,07 % = 0,7 kg /ha ) + **Fastac 10 EC** = 0,02 % ;

Tratamentul se va executa cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele , se va termina in 4 zile si se va repeta la 10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor ,oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide ( produse de protectia plantelor ),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Intocmit,  
 Ing. Borjoiu Liviu