




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

**AVERTIZAREA NR. 26 / 16.04.2019**

**UNCINULA N. ( Fainare ) + ACARIENI , etc. – VIȚA DE VIE**



**1. Universalis 593 SC = 2 L / ha + Vertimec 1,8 % EC = 0,75 – 1 L / HA**

**2. Falcon 460 EC = 0,3 L / ha + Envidor 240 SC = 0,4 L / ha**

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in faza **de 5-7 cm lungime** a lastarilor si se va termina in 4-5 zile .

Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai in focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 27 / 16.04 .2019**

**EURYGASTER SPP. ( PLOSNITA CEREALELOR ) – CEREALE PAIOASE**

**Proteus OD 110 = 0,4 L / ha sau Fury 10 EC = 0,1 L / ha sau Karate Zeon = 0,15 L / ha , sau Biscaya 240 OD = 0,2 L / ha , etc .**

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST – EXPERT** <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica atunci cand densitatea plosnitelor este de 7 adulti / mp. la graul cu densitate si vigoare normala si 5 adulti / mp la graul mai slab dezvoltat.

Tratamentul se va termina in 5-6 zile in conditii meteorologice normale , fara ploaie , la temperaturi sub 25<sup>0</sup> C si la viteza vantului sub 5 m / secunda .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,  
Ing. Liviu BORJOIU



## Informare privind utilizarea erbicidelor

Fermierii care utilizează la tratamentele fitosanitare erbicide vor respecta următoarele:

- utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul optim de aplicare, modul de acțiune, cantitatea de apă/ha, lista buruienilor combătute, modul de încorporare și compatibilitatea cu alte produse;
- aplicarea erbicidelor se poate face premergent, înainte de răsărirea buruienilor pe un sol bine mărunțit și nivelat pentru a prevenii îmburuienarea culturilor agricole, sau postmergent, după răsărirea buruienilor când pot fi identificate tipul de buruieni existente în cultură pentru combaterea țintă a acestora;
- tratamentele se aplică dimineața sau seara târziu (înainte de ora 9,00 sau după ora 20,00) pentru a profita de rouă și de temperaturile scăzute;
- pentru o bună eficacitate cele mai multe erbicide au nevoie de o umiditate suficientă în sol după tratament (irigare sau ploii);
- înainte de aplicarea produselor echipamentele de aplicare se verifică și se reglează;
- operatorul se asigură că supapele cu duze de oprire a picurării funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
- umplerea și curățarea echipamentului de stropit în curtea fermei trebuie să se efectueze cu o atenție deosebită, pe o platformă amenajată special pentru reținerea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și cursuri de apă, iar apa rezultată de la spălare să fie colectată în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
- zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apă;
- în timpul aplicării erbicidelor dacă se observă scurgeri la echipamentul de stropit acesta se oprește și se reglează;
- capetele parcelei se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
- nu se aplică erbicide pe teren înghețat sau îmbibat cu apă;
- este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteză a vântului mai mare de 5m/s pentru a evita fenomenul de drift care va determina apariția efectului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
- este interzisă aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexa nr. II din Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);
- la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, mască, mănuși, cizme de cauciuc);
- se vor aplica panouri de avertizare care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratată.