


Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău



Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 1 / 05 .01.2022**

**TRATAMENT LA SOL – SPAȚII PROTEJATE**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate.

**RAISAN 51**

Dezinfectia solului in sere	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematodul galic al radacinilor)	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat
Dezinfectia solului in sere	Buruieni	Buruieni anuale si perene	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat
Dezinfectia solului in sere	Boli	Fusarium sp. (Fuzarioza), Phytophthora sp. (Mana), Verticillium sp. (Ofilirea vasculara)	700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat

**BASAMID GRANULE**

Legume din solarul infiintate prin rasad	Dăunători	Coropisnita	250 kg/ha
Tomate sera	Boli	Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de p
Tomate sera	Dăunători	Nematodul galic al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de pl

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța 41 / 2007 .

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun , nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> SMR 10 - Introducerea pe piața a produselor de protecție a plantelor

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor , pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Sef Birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

**AVERTIZAREA NR. 2 / 05 .01.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la diferite culturi pentru combaterea **Soarecelui de Camp – MICROTUS ARVALIS**.

**BROMAKOL**

Cereale, pomi fructiferi, pepiniera	Dăunători	Soarele de camp	25-50g momeli/galerie activa	-
-------------------------------------	-----------	-----------------	------------------------------	---

Ca urmare a nesustinerii la nivelul UE de către notificator a substanței active bromadiolon, certificatul de omologare se retrage la data de **31.05.2021**. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **01.12.2021**) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de **01.06.2022**).

**Tratamentul se aplica la depistare.**

Momentul aplicării cel mai potrivit pentru preîntâmpinarea invaziilor și începerea tratamentului de combatere este atunci când numărul coloniilor (vetrelor de atac) ajunge la peste – 5 colonii / ha.

- După terminarea tratamentelor vor fi fixate și puse la loc vizibil placarde cu interdicția „TEREN OTRAVIT” scrise pe fond galben cu litere negre. Placardele vor fi așezate obligatoriu în colturile terenului tratat și la toate caile de acces.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr.41 / 2007.

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului. Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la PPP și apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați**

**Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN




Întocmit,  
Ing. Liviu BORJOIU



### AVERTIZAREA NR. 3 / 05 .01.2022

#### Erwinia amylovora (Focul bacterian al rozaceelor) – MAR, PAR, GUTUI

Taierea mecanică a ramurilor cu simptome la o distanță de cel puțin 50 cm sub limita prezentei simptomelor. Intregul material vegetal se va strânge și se va distruge prin ardere. Instrumentele folosite la tăiere vor fi dezinfectate după fiecare utilizare cu **hipoclorit de sodiu** 10 %, concentrație de 1 %. Ulcerațiile de pe trunchi vor fi extirpate inclusiv tesutul marginal de 2 cm, iar rana se dezinfectează. Ranile rezultate la tăiere, vor fi dezinfectate cu **1 % oxiclorigen de cupru**. Lucrarea se va executa înainte de tăierile obișnuite din livada și până la intrarea în vegetație a pomilor.

### AVERTIZAREA NR. 4 / 05 .01.2022

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agenților de daunare -

#### **- POMI FRUCTIFERI – Repaus vegetativ**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunătoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate.

#### DAUNATORI

##### MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarnă)	14 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarnă)	14 zile	-

##### JUVINAL 10 EC

plantatii de mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,1% (larve hibernante în per. de iarnă)	-	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,1% (larve hibernante în per. de iarnă)	-	-

##### ESTIUOIL/( YAGOS-a doua denumire comercială)

Cais	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Cires	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
gutui	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Nectarin	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Par	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-
Piersic	Dăunători	Paduchele din San Jose	0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha)	-	-

**OVIPRON TOP/(VERNOIL - a doua denumire comerciala)**

Cais	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile
Cires	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile
Nectarin	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile
Piersic	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile
Pomi fructiferi (mar, par)	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, puricele melifer al parului, afide, paduchele lanos	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile
Prun	• Dăunători	Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide	2500 ml/100 L apa sau 1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti	20 zile

**PLANTOIL**

Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Quadraspidiotus perniciosus (Păduchele din San Jose)	0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha)
pomi fructiferi (semin`toase)	Dăunători	Quadraspidiotus perniciosus (Păduchele din San Jose)	0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha)

**BOLI**

**ALCUPRAL 50 PU**

gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	4,5 kg/ha (0,3%) Se aplica prefloral
gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa
Mar	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului)	1,5-2,0 kg/ha
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	2,0 kg/ha (0,2%) Se aplica prefloral;
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa
Par	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului); Erwinia amylovora (Focul bacterian)	3,0 kg/ha (0,3%) in 1000 L apa
Prun	Boli	Polistigma rubrum (Patarea rosie a frunzelor de prun); Monilinia sp. (Monilioza)	2,0 kg/ha (0,2%)
Prun	Boli	Stigmia carpophila (Ciuruirea frunzelor)	1,5-2,0 kg/ha

**CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)**

Cais	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile
Cais	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile
Cires	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile
Mar	Boli	Rapan, focul bacterian	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica prefloral	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile
Piersic	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile
Prun	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile
Visin	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile

BOUILLIE BORDELAISE WDG

gutui	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7.5 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Venturia inaequalis (rapanul marului)	0,5% (7,5 kg/ha)	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7.5 kg/ha	-	-
Par	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7.5 kg/ha	-	-
Par	Boli	Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)	7.5 kg/ha	-	-
Piersic	Boli	Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (moniliza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
Prun	Boli	Polystima rubrum (patarea rosie a frunzelor de prun), Stigmia carpophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
Cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
Visin	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-

ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)

gutui	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Venturia spp (rapan)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Erwinia spp. (focul bacterian)	7,5 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Mosmon	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-
Par	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	-	-

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala ,la temperaturi de + 4 °C ; + 5 °C , la pomii fara apa , chiciura sau polei .Pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va efectua pana la faza de infrunzitul mugurilor – faza de urechiusa ,iar pentru speciile pomicole samburoase tratamentul se va efectua pana la sfarsitul repausului vegetativ – faza de buton alb sau roz .

-Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii ,mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr,  
 adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).