



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău, Jud. Buzău

e-mail: ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 15 / 25 .03 .2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

GRAPHOLITA MOLESTA (Molia orientala) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului)+ **TAPHRINA DEFORMANS** (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza), **SPHAEROTHECA P.** var. persicac (Fainare), **ASCOSPORA B.**(Ciuruire) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

CORAGEN

Nectarin	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile
Cais	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile
---------	-----------	---	---	--------

AFFIRM OPTI

Piersic	Dăunători	Miermele fructelor, Molia vargata a piersicului	2,5 kg/ha	7 zile
---------	-----------	---	-----------	--------

Fungicide:

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile
---------	------	---------------------	-------------------------	---------

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor	0,2 L/ha	7 zile
---------	------	---	----------	--------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Piersic	Boli	Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Minilinia spp. (moniliza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile
---------	------	--	------------------	--------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile
---------	------	---------------------	-------------------------	---------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica cand 10-15 % din flori si-au scuturat petalele cu repetare la 8 – 10 zile .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail: ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 16 / 25 .03.2024

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Blumeriella jaapi (patarea roșie a frunzelor), Stigmia cariophylla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza) + Paduchele verde, omizi defoliatoare, afidae, acarieni -

CIRES

FUNGICIDE

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea roșie a frunzelor), Stigmia cariophylla (ciuruirea micotică a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	---	------------------	--------	---

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Cires	Boli	Monilioza, patarea roșie a frunzelor	0,5 L/ha se aplică de la faza de buton alb până la coacere	7 zile	-
-------	------	--------------------------------------	--	--------	---

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comercială)

Cires	Boli	Monilioza, patarea roșie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

SWITCH 62.5 WG

Cires	Boli	Monilioze	1.0 kg/ha	7 zile	-
-------	------	-----------	-----------	--------	---

INSECTICIDE

DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială)

Cires	Dăunători	Paduchele verde	0,3 L/ha	7 zile	-
Cires	Dăunători	Viermele cireselor	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-

MOVENTO 100 SC

Cires	Dăunători	Paduchele negru al ciresului, Paduchele din San Jose (generațiile de vară)	1,875 l/ha se aplică la avertizare de la sfârșitul înfloritului	21 zile	-
-------	-----------	--	---	---------	---

Tratamentul se va aplica atunci **cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele**, se va termina in 5- 6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei

Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 17 / 25 .03.2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE in spatii protejate**.

DAUNATORI

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

APACHE/VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1.8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FLIPPER

tomate (c-camp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoplid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	---	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde	0,02% (0.2 l/ha)	
-------------	-----------	-----------------	------------------	--

Ca urmare a nesustinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

BOLI**CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
--------	------	---	--	--------------

BOULLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	Pseudomonas tomato (patarea pustulara), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii
--------	------	--	-------------------	--

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafeie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	---	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafeie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacimilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	--	---------------	--------------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile
Tomate (rasad)	Boli	caderea plantutelor, mana de sol, putregaiul radacinilor	0,15 % (4-5 l sol./mp)	

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul https://www.anfd.ro/sanatare/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon/ fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 18 / 25 .03. 2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

-DAUNATORI RAPITA- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

EXIREL

Rapita	Dăunători	Plutellaxylostella,Ceutorhynchus napi,Aphis spp. Meligethes aeneus	0,100 L /ha	--
--------	-----------	---	-------------	----

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	--
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	--

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile
--------	-----------	---	----------	---------

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile
--------	-----------	---	--------------------------------------	---------

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paduchele cenusiu	0,2 l/ha	--
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	--
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	--
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	--

CARNADINE

Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus napi (Gargarita tulpinilor de rapita)	0,15-0,25 L/ha Se aplica de la primele internoduri vizibile pana	28 zile
Rapita	Dăunători	Meligethes aeneus (Gandacul lucios al rapitei)	0,15-0,25 L/ha Se aplica atunci cand mugurii florali sunt prezen	28 zile
Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus assimilis (Gargarita semintelor de crucifere), Dasineura brassicae (Țânțarul silicvelor de rapita)	0,15-0,25 L/ha Se aplica de la 10% din flori de pe racemul princ	28 zile
Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus pallidactylus/quadridens (Gargarita tulpinilor de rapita)	0,15-0,25 L/ha Se aplica de la primele internoduri vizibile pana	28 zile

-BOLI RAPITĂ (Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.)

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha	30 zile	-
--------------------	------	---	----------	---------	---

PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)

Rapita de toamna si primavara	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria spp. (Alternarioza); Plenodomus lingam (Putregaiul negru al rapitei); Hyaloperonospora parasitica (Mana cruciferelor); Botryotinia fuckeliana (Putregaiul cenușiu)	0,6-1,0 L/ha		
-------------------------------	------	--	--------------	--	--

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb , putregaiul cenușiu, inegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome d	56 zile	-
--------------------	------	---	--	---------	---

PROTENDO 300 EC/ (PECARI - a doua denumire comerciala)

Rapita de toamna	Boli	Alternaria brassicae (Alternarioza); Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	0,3-0,6 L/ha Se aplica de la inceputul infloritului pana la infl	56 zile	2
Rapita primavara	Boli	Leptosphaeria maculans (Putregaiul negru); Alternaria brassicae (Alternarioza); Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	0,3-0,5 L/ha Se aplica de la primele simptomeale aparitiei atacu	56 zile	2

MATIZ / (ERASMUS - a doua denumire comerciala)

Rapita	Boli	Putregaiul negru (fomoza)	0,5 l/ha	56 zile	-
--------	------	---------------------------	----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru fetele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit,
Ing. Liviu BORJOIU

