

AVERTIZAREA NR. 44 / 03 .07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea agentului de dăunare Cuscuta (Cuscuta sp.).

Cuscuta (Cuscuta sp.)



Cuscuta este o buruiănă parazită care nu produce clorofilă. Filamentele de cuscută au ventuze care se hrănesc direct cu nutrienții lucernei. Filamentele de cuscută cresc rapid și formează grupuri în câmpuri care formează cercuri mari în parcele, care sugrumă lucerna. O mulțime de alte plante sunt sensibile la cuscută: trifoi, sfeclă roșie, tomate, morcovi, cartofi, dar și unele buruieni.

COMBATERE

AGRO- GLYFO / (GLYPHO - a doua denumire comerciala)

lucerna	Buruieni	Cuscuta spp.	0,5-0,7 L/ha (0,2-0,3%)	Se aplica la 5-7 zile dupa cosire	[-]
---------	----------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-----

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine, din Romania, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzau organizeaza cursuri de instruire initiala care se adreseaza utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor si consilierilor in conformitate cu prevederile art. 5 ali. 1 din OUG nr . 34/ 2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei si Ordinului nr . 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului mediului si ministrului sanatatii privind sistemul de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protectia plantelor din sectorul agricol (producatori agricoli) si sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizeaza aceste produse in cadrul activitatii profesionale , distribuitori , inclusiv angrosisti , vanzatori cu amanuntul , vanzatori si furnizori de produse de protectie a plantelor , consilieri care ofera consultanta in ceea ce priveste gestionarea integrata a organismelor daunatoare si utilizarea corecta a produselor de protectia plantelor , este o obligatie a fiecarui stat membru al Uniunii Europene din care face parte si Romania .

Oficiul Fitosanitar Buzau desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfd.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alaturat va atasam si manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN



ROL
ECONOMIC

Albinele contribuie
la producții agricole
mai mari și de
calitate.

ROL
ECOLOGIC

Albinele și alte insecte
polenizatoare mențin
echilibrul ecosistemelor
și biodiversitatea.

PENTRU O AGRICULTURĂ PRODUCTIVĂ ȘI POLENIZATORI PROTEJAȚI!

ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea
protejării polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și
mediului.

COLABORAREA ACTIVĂ
dintre producătorii agricoli,
consiliile locale și apicultori
implică obligații pentru
părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



Aplicarea produselor de protecție
a plantelor la culturile agricole și horti-
cole entomofile aflate în faza de înflori-
re, precum și la pădurile formate din
specii melifere, se face cu respectarea
instrucțiunilor de pe eticheta produsu-
lui, inclusiv a informațiilor că produsul
de protecție a plantelor poate fi utilizat
în perioada de activitate a albinelor sau
a altor specii care nu sunt vizate sau în
timpul înfloririi culturilor agricole sau a
buruienilor sau alte fraze de acest tip
menite să protejeze albinele, în cazul în
care este permisă utilizarea în astfel de
condiții.



**CITIȚI ETICHETA!
RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE!**



2. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI (UTILIZATORI PROFESIONIȘTI)



Producătorii agricoli care efectuează trata-
mente fitosanitare la culturile agricole, hortico-
le și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic,
consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de
efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- locul fizic și parcela unde se aplică
tratamentul;
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a
plantelor utilizat,
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare
terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de
protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



48 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORI CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii
profesioniști/persoanele fizice, administratorii
culturilor agricole, hortico-
le și silvice au
obligația să anunțe în scris și telefonic
apicultorii care au vatra de stupină
staționară/permanentă sau temporară/
pastorală cu cel puțin 24 de ore înainte
efectuării tratamentelor cu produse de
protecție a plantelor, în vederea prevenirii
intoxicațiilor la albine și alte insecte
polenizatoare.



24 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris,
în termen de 24 de ore de la instalarea
vetrei de stupină, consiliul local/primăria,
despre:

- locul de amplasare a stupilor;
 - perioada de timp;
 - numărul familiilor de albine;
 - datele de contact,
- pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul
aplicării unor tratamente fitosanitare
la culturile agricole.



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare
cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plantele melifere,
cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor,
în perioada înfloririi.



Produsele toxice pentru albine
au fraza SPE8 pe etichetă.

SPE8

"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi
culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚI! PROTEJAȚI ALBINELE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.anfd.ro

AVERTIZAREA NR. 42 / 03.07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de măr.

VIERMELE MERELOR (CYDIA POMONELLA) – G 2



Viermele merelor, cunoscut sub denumirea științifică de *Cydia pomonella*, este un daunator periculos, ataca fructele de mar, par, prun, gutui, cais, piersic, nuc și alte specii, producând daune importante atât în livezi, cât și în grădini. Femelele depun ouale izolat pe frunze și fructe, când acestea au mărimea unei alune, larvele aparute rod galerii în fructele tinere și se hrănesc cu pulpa și samburii cruzi. Drept urmare, fructele își încetează creșterea, devin violacee și cad pe sol iar larvele se hrănesc în continuare până la dezvoltarea completă după care se retrag sub scoarța exfoliată a trunchiurilor și își confecționează coconul matasos pentru a se transforma în pupe.

COMBATERE

LASER 240 SC/ (NEXSUBA - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	<i>Cydia pomonella</i> (Viermele merelor)	0,9 L/ha	7 zile	-
-----	-----------	---	----------	--------	---

DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul marmorat, afide	0,375-0,4 L/ha	7 zile	-
Mar	Dăunători	Înțelul pomilor, cotarul verde, cotarul brun, omida paaroasă, omida mică	0,375 L/ha	7 zile	-
Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose, paduchele verde al marului, viespea merelor	0,45 L/ha	7 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplică la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha în 1500 l apă) se aplică la avertizare	7 zile	-

CORAGEN

Mar	Dăunători	Minierul marmorat, minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile	-
-----	-----------	--	-----------	---------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile	-
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Rapănul mărului (*Venturia inaequalis*)



Rapănul mărului, cauzat de ciuperca *Venturia inaequalis*, este cea mai păgubitoare boală a mărului, pe frunze apar pete mici, circulare, inițial galbene, apoi maronii-olivacee, cu aspect catifelat, care se înnegresc și se unesc, provocând uscarea și căderea frunzelor (defoliere), pe fructe apar pete cenușii-negricioase, textura țesutului devine lemnoasă, fructele se deformează, crapă și cad prematur, pe lastari apar crapături care provoacă uscarea.

FUNGICIDE

CHORUS 50

Mar	Boli	Rapan	0,45-0,75 kg/ha	21 zile	-
-----	------	-------	-----------------	---------	---

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	0,15% (2,25 kg/ha in 1500 L apa)	28 zile	-
-----	------	---	----------------------------------	---------	---

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

KARATHANE M 35 CE

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	-	-
-----	------	---------	-------------------	---	---

DOMARK 10 EC

Mar	Boli	Rapan, fainarea	0,4 l/ha (0,027 %)	14 zile	-
-----	------	-----------------	--------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine, din Romania, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit,

Coordonator OF Buzau

Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

AVERTIZAREA NR. 43 / 03.07.2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de prun.

Viermele prunelor (Cydia funebrana) G2



Primii adulți apar la începutul lunii mai (în zonele se stepa și silvostepa) sau spre sfârșitul lunii (în subzona stejarului și a fagului) și devin activi la temperaturi medii de peste 10 °C. Imperecherea are loc imediat după apariție, urmată imediat de depunerea ouă. Din cele 5-7 săptămâni în care își realizează adulții zborul, femelele depun în decurs de o lună cele 40-80 de ouă. Larvele aparute rod galerii în fructele tinere și se hrănesc cu pulpa și samburii cruzi. Drept urmare, fructele își încetează creșterea, devin violacee și cad pe sol iar larvele se hrănesc în continuare până la dezvoltarea completă după care se retrag sub scoarta exfoliată a trunchiurilor și își confecționează coconul matasos pentru a se transforma în pupe.

COMBATERE

LASER 240 SC/ (NEXSUBA - a doua denumire comercială)

Prun	Dăunători	Eurytoma schreinerii (Viespea samburilor de prun), Cydia funebrana (Viermele prunelor)	0,6 L/ha	7 zile	-
------	-----------	---	----------	--------	---

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea samburilor de prun	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide	0,25 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose, viespile prunelor, paduchele cenușiu al prunelor	0,3 L/ha	7 zile	-

CORAGEN

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	100 ml/ha	14 zile	-
------	-----------	-------------------	-----------	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Monilioza (Monilinia laxa)



Monilioza la prun, cauzată de *Monilinia laxa* și *M. fructigena*, este o boală fungică devastatoare (putregai brun, arsură moniliană), capabilă să distrugă peste 90% din producție și să usuce pomii. Se manifestă primăvara prin ofilirea florilor/lăstarilor și vara prin putrezirea/mumifierea fructelor.

FUNGICIDE

CHORUS 50

Prun	Boli	Monilioze	0,45-0,75 kg/ha	7 zile	-
MRL					

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

SYLLIT 400 SC

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor de prun		0,13% (	
------	------	-----------------------------------	--	---------	--

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Prun	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacerea depl	7 zile	-
------	------	--	--	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

